

Arteninfos - Ziertauben Z 2

Ringeltaube

Ringeltaube

Palumbus palumbus



Erscheinungsbild

Die in Europa von Spanien bis zum Ural beheimatete Nominatform ist etwas über haustaubengroß.

Artenmerkmale

Halsseiten mit grünglänzendem und weißem Fleck versehen. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.

Himalajataube

Palumbus pulchricollis



Erscheinungsbild

Eine große Taube, die in der Größe zwischen Ringeltaube und Guineataube einzustufen, aber etwas schlanker ist. Auffällig ist ein breites Nackenband, das von hellorange leuchtender Färbung mit einem dunklen, schuppenähnlichen Muster ist und zur Kehle hin schmaler wird.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind fast gleich gefärbt. Beim Tauber kann das Gefieder im Farbbild etwas leuchtender blau sein und Täubinnen sind oft etwas zarter.

Columba

Hohltaube

Columba oenas



Erscheinungsbild

Etwa stadtaubengroß.

Artenmerkmale

Bei mohnblauer Gesamtfärbung sind Halsseiten und ein Nackenband durchgehend grün glänzend, Vorderhals und Brust weinrötlich. Die Flügeldecken zeigen schwarze Basisflecken, die aber keine Binde bilden. Grauschwarze und verhältnismäßig lange Handschwingen; Schwanz mit schieferschwarzer Endbinde.

Felsentaube

Columba livia livia



Erscheinungsbild

Knapp stadttaubengroß, dabei etwas zarter, schlanker und mit schmalere Schnabel, kleinerer Wachshaut (Schnabelwarzen) sowie etwas kürzerem Schwanz. Die Täubin ist häufig matter gefärbt.

Artenmerkmale

Bläulich graue Grundfarbe, die Flügeldecken sind heller mit zwei schwarzen Binden oder auch gehämmert. Die Wachshaut (Schnabelwarze) ist hell.

Guineataube

Columba guinea guinea



Erscheinungsbild

Gut stadtaubengroß.

Artenmerkmale

Am Hals ein breiter Ring mit gegabelten Federn. Diese sind rotbraun mit grauen Spitzen und grünlichem Glanz. Schnabel schwarz mit einer fast weißen Wachshaut, die Kopfseiten sind mit einer nackten, leicht warzigen, rötlichen Haut bedeckt, die vom Zügel bis hinter die Augen reicht. Irisfarbe orangefarbig mit stäbchenförmiger Pupille. Die Geschlechter sind kaum unterscheidbar.

Dendroteron

Oliventaube

Dendroteron arquatrix



Erscheinungsbild

Größe einer Ringeltaube, jedoch etwas schlanker. Auffallend sind gelber Schnabel, gelbe Orbitalringe sowie gelbe Läufe und weiße Fleckung im Mantelgefieder.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sehen sich ähnlich. Die Täubin kann jedoch mattere Brustfarbe, verschwommenere Brustflecken und eine dunklere Kopffarbe haben.

Streptopelia

Turteltaube

Streptopelia turtur



Erscheinungsbild

Lachtaubengröße.

Artenmerkmale

Auf jeder Halsseite ein auffälliger Fleck, der aus fünf am Ende breit abgerundeten, schwarzen Federn mit weißlich grauen Endsäumen besteht. Augenränder dunkelrot.

Madagaskar-Turteltaube

Streptopelia picturata



Erscheinungsbild

Fast stadttaubengroße Statur mit etwas kürzerem Schwanz und längeren Beinen als andere Turteltauben.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind farblich nicht zu unterscheiden. Augenränder rot und an den Halsseiten kleine schwarzgepunktete Flecken.

Halbmondtaube

Streptopelia semitorquata



Erscheinungsbild

In der Form ähnelt diese Taube einer Lachtaube, ist aber deutlich größer und stärker.

Artenmerkmale

Die schwarze Halbmondzeichnung des Halses ist fein silbergrau gesäumt, der Augenrand rot. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.

Türkentaube

Streptopelia decaocta decaocta



Erscheinungsbild

Etwas größer als die Lachtaube, die ihr farblich sehr ähnelt. Die Türkentaube ist aber etwas dunkler.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind gleich hellgrau gefärbt. Wobei die Täubin häufig etwas kleiner ist.

Perlhalstaube

Streptopelia chinensis chinensis



Erscheinungsbild

Etwa lachtaubengroß, nur mit kürzeren Flügeln und längeren Schwanzfedern. Länge ca. 32 cm.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden. Die gabelförmigen Nackenfedern bilden einen breiten, schwarzweiß getüpfelten Nackenfleck (Perlhalsband).

Gefleckte Perlhalstaube

Streptopelia chinensis suratensis



Erscheinungsbild

Knapp lachtaubengroß mit kürzeren Flügeln und längeren Schwanzfedern. Länge der Tiere ca. 25 cm.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden. Die gabelförmigen Nackenfedern bilden einen breiten, schwarzweiß getüpfelten Nackenfleck (Perlhalsband). Die farbige Zeichnung des Rückens, des Bürzels, der großen und kleinen Flügeldecken erweckt den Eindruck eines gesprenkelten Vogels und ist das namensgebende Merkmal.

Hinterindische Perlhalstaube

Streptopelia chinensis tigrina



Erscheinungsbild

Etwa lachtaubengroß, nur mit kürzeren Flügeln und längeren Schwanzfedern. Länge der Tiere ca. 28 cm.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden. Die gabelförmigen Nackenfedern bilden einen breiten, schwarzweiß getüpfelten Nackenfleck (Perlhalsband).

Senegaltaube

Streptopelia senegalensis



Erscheinungsbild

Kleiner als die Lachtaube.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden, wobei die Täubin häufig etwas zarter und in der Gefiederfarbe matter sein kann. Auffallend ist das schwarz gepunktete Halsband.

Weinrote Halsringtaube

Streptopelia tranquebarica tranquebarica



Erscheinungsbild

Kleiner als die Lachtaube und von gedrungener Gestalt, im Schwanz kürzer.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ein unterschiedliches Farbbild, bei dem der Kopf des Taubers blaugrau ist.

Südostasiatische Weinrote Halsringtaube

Streptopelia tranquebarica humilis



Erscheinungsbild

Deutlich kleiner als die Lachtaube und von gedrungener Gestalt, im Schwanz kürzer.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ein unterschiedliches Farbbild, bei dem der Kopf des Taubers im Gegensatz zum bräunlich grauen der Täubin blaugrau ist.

Östliche Weinrote Halsringtaube

Streptopelia tranquebarica murmensis



Erscheinungsbild

Deutlich kleiner als die Lachtaube und von gedrungener Gestalt. Im Schwanz kürzer. Länge ca. 18 cm. Die kleinste der drei Unterarten wirkt dabei etwas schlanker.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ein unterschiedliches Farbbild, bei dem der Kopf des Taubers im Gegensatz zum bräunlich grauen der Täubin blaugrau ist. Auffallend ist der orangefarbige Augenrand.

Lachtaube

Streptopelia roseogrisea risoria



Erscheinungsbild

Die Lachtaube hat eine Größe von etwa 27 cm und muss immer den schlanken, beweglichen Typ einer Wildtaube zeigen.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter haben gleiche Farb- und Zeichnungsanlagen. Auffallendes Artenmerkmal ist bei grauer Grundfarbe ein schwarzes Nackenband, dieses bis gut an die Halsseiten reichend. Größere Aufmerksamkeit sind den angegebenen Unterschwanzzfarben einschließlich der Keilfarbe zu, um Kreuzungstiere bei der Begutachtung heraus zu finden. Dieses bezieht sich auf den zusammengelegten Unterschwanz.

Patagioenas

Pikazurotaube

Patagioenas picazuro picazuro



Erscheinungsbild

Kaum größer als eine Stadttaube. Die Länge der Tiere ist 37-38 cm.

Artenmerkmale

An den Halsseiten und im Nacken ein Ring aus schuppenartigen weißen und grauen Federn mit schwarzen Säumen; Schnabel mit grau bepudelter Nasenwachshaut; Augenränder karminrot. Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden. Die Täubin ist meist etwas schwächer.

Nacktaugentaube

Patagioenas corensis



Erscheinungsbild

Die Größe einer Stadttaube. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Auffallend ist das namensgebende, nackte Augenumfeld.

Artenmerkmale

Ein breiter Orbitalring in der Augenumgebung, der innen hell und nach außen dunkler wird, ist augenfällig. Diese Färbung des nackten Augenumfeldes kann vor allem mit zunehmendem Alter variieren. Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden. Die Täubin ist jedoch etwas schwächer.

Antillentaube

Patagioenas squamosa



Erscheinungsbild

Etwas größer als die Felsentaube. Bei dunkelschiefergrauer Gesamtfärbung ein auffallend gelber Augenrand.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind ähnlich gefärbt, dabei schimmert der veilchenfarbene, nackenrunde Halsfleck beim Täuber intensiver.

Fleckentaube

Patagioenas maculosa albipennis



Erscheinungsbild

Die Größe einer Stadttaube mit kräftiger, breite rund gerundeter Form. Die namensgebende Fleckenzeichnung des Flügelschildes ist bei der dunkleren Nominatform deutlicher sichtbar.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind gleich gefärbt, wobei die Täubin in der Regel etwa: kleiner ist.

Leucosarcia

Wongataube

Leucosarcia melanoleuca



Erscheinungsbild

Weist die Größe einer Ringeltaube mit kräftiger, breiter und runder Form, aber etwas kürzerem Flügel auf.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind schwer zu unterscheiden. Bei schiefergrauer Oberseite ist die Unterseite mit weißen Federsäumen auffallend gezeichnet.

Ocyphaps

Schopftaube

Ocyphaps lophotes



Erscheinungsbild

Größer als die Lachtaube, nicht ganz so schlank und elegant wie diese.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden. Auffälligstes Merkmal ist der spitze, fast aufrecht stehende Federschopf (Spitzhaube).

Chrysauchen

Kupfernackentaube

Chrysauchen humeralis



Erscheinungsbild

Größe einer Lachtaube, ca. 28 cm lang, aber mit kürzeren Flügeln und längerem Schwanz.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind farblich kaum zu unterscheiden, wobei die Täubin häufig etwas kleiner ist. Die Zeichnung des Mantelgefieders ähnelt einer Sperberung mit auffallend goldkupfrig glänzendem Nacken.

Zenaidura

Socorrotaube

Zenaidura macroura graysoni



Erscheinungsbild

Diese ursprünglich auf der mexikanischen Insel Socorro beheimatete, aber inzwischen dort nicht mehr anzutreffende Art ist im Körper etwas größer und stärker sowie langschwänziger als die Lachtaube.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind gleich gefärbt, wobei der violettrotlich schillernde Halsfleck beim Täuber intensiver ist. Der Schnabel ist etwas länger als bei den anderen *Zenaidura*-Arten.

Carolinataube

Zenaidura macroura



Erscheinungsbild

Etwa kleiner als eine Lachtaube, schlanker und mit längerem, gestuftem Schwanz. Unterhalb des Ohres sitzt ein schwarzer Fleck.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind fast gleich gefärbt und haben einen blaugrauen Orbitalring. Der Tauber zeigt im Nackenbereich mehr Gefiederglanz und ist insgesamt etwas intensiver in der Gefiederfärbung.

Ohrflecktaube

Zenaidura auriculata



Erscheinungsbild

Diese auf dem südamerikanischen Kontinent vorkommende Taube ist etwa kleiner als die Lachtaube und hat einen gerundeten, deutlich kürzeren Schwanz.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind ähnlich gefärbt, wobei das Blanzgefieder des Täubers intensiver und der Oberkopf grauer ist. Ein schmaler schwarzer Streifen hinter dem Auge und ein stärkerer, blau schillernder darunter im Ohrbereich gab dieser Art den Namen.

Zenaida

Küstentaube

Zenaida aurita



Erscheinungsbild

Etwa in Größe einer Lachtaube, aber mit deutlich kräftigerem Körper, kürzerem Schwanz und höheren Läufen.

Artenmerkmale

Die Armschwingen und schwarzen Flügeldecken sind weiß gesäumt und beide Geschlechter fast gleich gefärbt. Der Täuber ist im Nackenbereich etwas gräulicher.

Phaps

Bronzeflügeltaube

Phaps chalcoptera



Erscheinungsbild

Eine große Taube, fast so groß wie die Guineataube, mit relativ kleinem Kopf.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind unterschiedlich gefärbt, wobei die Flügeldecken mit bronzegrünen Glanzflecken auf den Außenfahnen namensgebend sind.

Kleine Bronzeflügeltaube

Phaps elegans



Erscheinungsbild

Etwas kleiner als die Stadtaube und im Vergleich mit der Bronzeflügeltaube plumper, zartköpfiger mit kürzeren Flügeln sowie kürzerem Schwanz.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind ähnlich gefärbt, die Täubin ist matter im Gefieder mit braunem Anflug auf der grauen Unterseite.

Aplopelia

Zimttaube

Aplopelia larvata larvata



Erscheinungsbild

Größer als die Lachtaube, mit längeren Läufen, kurzem Schwanz und Flügel.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind ähnlich gefärbt, weiße Stirn, Kinn- und Wangenpartie, wobei der Täufer in der Stirnfarbe heller erscheint.

Chalcophaps

Grünflügeltaube

Chalcophaps indica indica



Erscheinungsbild

Lachtaubengroß, aber kompakter im Körper, mit kürzerem Schwanz und Flügel.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ähnliches Farb- und Zeichnungsbild, Oberrücken und Flügel erzgrün.

Australische Grünflügeltaube

Chalcophaps indica chrysochlora



Erscheinungsbild

Lachtaubengroß, aber kompakter im Körper, mit kürzerem Schwanz und Flügel.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ähnliches Farb- und Zeichnungsbild, Oberrücken und Flügel erzgrün.

Gallicolumba

Celebes-Gelbbrust-Erdtaube

Gallicolumba tristigmata tristigmata



Erscheinungsbild

Die Celebes-Gelbbrust-Erdtaube ist die größte *Gallicolumba*-Art. Größer als eine Stadttaube, mit runder, hochbeiniger Erdtaubenfigur.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind ähnlich gefärbt; gelbe Stirn und Brustpartie mit weinrotem Nackenfleck. Ein schmaler Augenrand ist rötlich.

Bartlett-Dolchstichtaube

Gallicolomba criniger



Erscheinungsbild

Etwas kräftiger als die Dolchstichtaube. Im Gesamtfarnton kräftiger

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden, lediglich in der Irisfarbe kann es wie bei der Dolchstichtaube kleine Unterschiede geben. Weinroter Brustfleck und gelbbraunes Bauchgefieder.

Dolchstichtaube

Gallicolomba luzonica



Erscheinungsbild

Größe einer Lachtaube, etwa 28 cm lang, jedoch höher im Stand, kürzer im Schwanz und der Körper ist gedrungener.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden,. Unterschiedliche Größe des Dolchstichs und bläulichere Irisfärbung des Täubers sind nicht generell verbindlich. Blau im Mantelgefieder, mit zwei schwarzen Flügelbinden, und auffallend ist der rote Brustfleck.

Geotrygon

Jamaika-Erdtaube

Geotrygon versicolor



Erscheinungsbild

Die Jamaika-Erdtaube hat die Größe einer Stadttaube von rundlicher Form, hochbeiniger Erdtaubenfigur mit ziemlich langem Schwanz.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind gleich gefärbt, wobei Scheitel und Nackengefieder eine kurze Nackenhaube bilden. Der Täuber hat etwas dunklere Keilfarbe, dagegen läuft die der Täubin weißgesäumt aus.

Rote Erdtaube

Geotrygon montana montana



Erscheinungsbild

Etwas größer als eine Lachtaube, jedoch mit gerundeter Figur und kürzerem Schwanz.

Artenmerkmale

Die Geschlechter unterscheiden sich deutlich voneinander. Der Täuber ist ziegelrot, die Täubin kaffeebraun.

Columbigallina

Rosttäubchen

Columbigallina talpacoti talpacoti



Erscheinungsbild

Etwas kleiner als das Diamanttäubchen, aber von gedrungener Gestalt mit kurzem Schwanz.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind unterschiedlich gefärbt. In der Gesamtfärbung ein kräftiges Weinrötlich bis Braun.

Mexikanisches Rosttäubchen

Columbigallina talpacoti eluta



Erscheinungsbild

Etwas kleiner als das Diamanttäubchen, aber von gedrungener Gestalt mit kurzem Schwanz.
Etwas kleiner als die Nominalform.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind unterschiedlich gefärbt. In der Gesamtfärbung mehr mattbraun.

Mittelamerikanisches Rosttäubchen

Columbigallina talpacoti rufipennis



Erscheinungsbild

Etwas kleiner als das Diamanttäubchen, aber von gedrungener Gestalt mit kurzem Schwanz. Etwas kleiner und schlanker als die Nominalform.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind unterschiedlich gefärbt. In der Gesamtfärbung leuchtender rotbraun als *Columbigallina talpacoti talpacoti*.

Nesopelia

Galapagostaube

Nesopelia galapagoensis galapagoensis



Erscheinungsbild

Ähneln in der Figur eher einem Star als einer Taube, mit langen Beinen und ist relativ kurzschwänzig.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind gleichgefärbt. Die Täubin ist häufig etwas kleiner als der Täuber. Das Mantelgefieder erscheint unregelmäßig mit schwarzer Tropfenzeichnung und weißen Längsstreifen, der Flügelbug meistens mit feinen weißen Streifen.

Oena

Kaptäubchen

Oena capensis capensis



Erscheinungsbild

Kaum größer als das Diamanttäubchen, aber gleich stark bzw. mit längerem Schwanz.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ein unterschiedliches Farb- und Zeichnungsbild. Der Täuber hat von der Stirn bis zur Oberbrust eine schwarze Maske.

Geopelia

Sperbertäubchen

Geopelia striata striata



Erscheinungsbild

Etwas größer als Diamanttäubchen und nicht so schlank.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen gleiches Farb- und Zeichnungsbild. Halsseiten, Brust und Flanken fein schwarz und weiß gestreift.

Gesellschaftstäubchen

Geopelia striata placida



Erscheinungsbild

Das in Nordaustralien und Neuguinea beheimatete Täubchen ist etwas kleiner als das sehr ähnliche Sperbertäubchen.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind gleich gefärbt und die schwarzweiße Streifung beschränkt sich auf den Hals- und Nackenbereich. Insgesamt mit unruhigerer Sperberzeichnung als die Sperbertäubchen.

Timortäubchen

Geopelia maugens



Erscheinungsbild

Das auf den Kleinen Sundainseln beheimatete Timortäubchen ist dem Sperbertäubchen sehr ähnlich. Es ist etwas größer als dieses und neben dem Friedenstäubchen das größte Täubchen dieser Gattung.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind gleich gefärbt. Die schwarzweiße Streifung ist wie beim Friedenstäubchen durchgehend, aber weiter zum Bauch hinunter als bei diesem ausgeprägt, auch nicht unterbrochen in der Hals- und Brustmitte wie beim Sperbertäubchen. Auffälliges Artmerkmal ist der kräftige gelbe Orbitalring.

Tympanistra

Tambourintäubchen

Tympanistria tympanistria tympanistria



Erscheinungsbild

Deutlich kleiner als eine Lachtaube, mit kompakterem Körper und kürzerem Schwanz als diese.

Artenmerkmale

Die Geschlechter zeigen ein unterschiedliches Farb- und Zeichnungsbild. mit weißer Unterseite des Täubers. Die erste Handschwinge ist zugespitzt.

Columbina

Perutäubchen

Columbina cruziana



Erscheinungsbild

Etwas kleiner als das Diamanttäubchen, aber kompakter erscheinend und mit kürzerem Schwanz.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind fast gleich gefärbt und zeigen einen auffallend gelbschwarzen Schnabel.

Turtur

Stahlflecktäubchen

Turtur afer



Erscheinungsbild

Um gut ein Drittel kleiner als die Lachtaube, aber mit kompakter Figur.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind gleich gefärbt. Auffallend sind der gelbrötliche Schnabel und zwei große, metallisch blau schimmernde Flecken auf den Flügeldecken.

Bronzeflecktäubchen

Turtur chalcospilos



Erscheinungsbild

Von der Figur her dem Stahlfleck- und Erzflecktäubchen gleich, nur etwas kleiner.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind gleich gefärbt. Auffallend sind die zwei großen, metallisch grün glänzenden Flügelflecken.

Stictopeleia

Diamanttäubchen

Stictopeleia cuneata



Erscheinungsbild

Ein Täubchen mit auffallend langem und spitz auslaufendem Schwanz, niedrig gestellt, Ferse meist nicht sichtbar.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind fast gleich gefärbt. Blaugraue Grundfarbe mit vielen kleinen weißen Punkten auf dem Flügelschild. Runder Kopf mit zur Stirn nur gewinkelt schmalen Schnabel. Breiter, leuchtend roter, warziger Augenrand. Augenrand beim Täuber intensiver, breiter. Die Taube ist etwas matter in der Farbe und erscheint an Kopf, Hinterhals und Schultern brauner.

Kuckuckstauben

Bindenschwanz-Kuckuckstaube

Macropygia unchall



Erscheinungsbild

Eine schlanke Taube, in der Größe zwischen Stadttaube und Ringeltaube mit sehr langem Schwanz. Typisch für diese Gruppe ist die dunkle Querbänderung des Schwanzes.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind verschieden gefärbt. Die mittleren Schwanzfedern sind besonders lang, die anderen dazu abgestuft kürzer. Die Täubin ist auch bei den verschiedenen Unterarten stets im Hals- und Brustbereich stärker gebändert.

Fruchttauben

Prachtfruchttaube

Ptilinopus superbus superbus



Erscheinungsbild

Fast Lachtaubengröße, aber mit kürzerem Schwanz und kompakterer Gestalt.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind verschieden gefärbt.

Grüntauben

Keilschwanz-Grüntaube

Treron spehenura spehenura



Erscheinungsbild

Fast die Größe einer Stadtaube mit deutlich längerem Schwanz.

Artenmerkmale

Beide Geschlechter sind unterschiedlich gefärbt. Der Täuber ist farblich ausgeprägter mit dem Rotbraun im Schulter- und dem Goldton im Brustbereich. Im Gegensatz zur fast grün gefärbten Täubin.

Frühlingstaube

Treron vernans



Erscheinungsbild

Etwa lachtaubengroß, aber mit kürzerem Schwanz und kompakterem Körper. Es gibt mehrere Unterarten, bei denen die Farbintensität etwas unterschiedlich sein kann.

Artenmerkmale

Die Geschlechter sind verschieden gefärbt, wobei es den Täubinnen u. a. an den violettrosafarbenen Halsseiten des Täubers fehlt.